

Buntspecht

(*Dendrocopos major*)

Weitere Informationen finden Sie unter den einzelnen Kategorien des „H.I.L.F.“-Schemas

Aussehen

Buntspechte haben eine Körperlänge von ca. 23- 26 cm & eine Flügelspannweite von ca. 34- 39 cm. Sie sind ca. 60- 90 g schwer. Ihre Gefiederoberseite ist schwarz mit großen weißen Flügelflecken & ihre Unterseite ist hellbeige-weiß. Ein roter Nackenfleck & Unterschwanzdecke sind typisch für ausgewachsen Männchen, Weibchen haben keinen Nackenfleck. Jungtiere haben eine rote Stirn. Spechte haben weiße Wangen. Der Schnabel ist lang, kräftig & schwarz

Lebensraum

- Vorkommen in weiten Teilen Deutschlands
- Jahresvogel
- bevorzugen Eichen- & Buchenmischwälder mit viel Totholz
- Laub- & Nadelwälder,
- Alleen
- Windschutzstreifen
- Parks & Kulturlandschaften

Nahrung/Physiologie

- Vertreter des „Meißel-schnabels“
- Insekten & deren Larven
- Nadelbaumsamen
- im Winter:
 - Nüsse, Beeren, Samen
 - Futterhäuschen
- teils auch Jungvögel & Eier
- klemmen Nahrung (Nüsse, Kiefernzapfen) in Baumspalten ein

Verhalten

Der Buntspecht hat spitze gebogene Krallen, mit denen er sich an der Borke festkrallen kann. Zwei Zehen sind dabei nach vorn & zwei nach hinten gerichtet. Buntspechte fliegen wellenartig, mit den Flügelschlägen an der tiefsten Stelle des Fluges, sonst liegen Flügel im Flug dicht am Körper an. Das Anlocken von Weibchen in der Balzzeit & zur Revierabgrenzung erfolgt durch ein „Trommeln“ gegen Holz & andere Gegenstände. Die Brutzeit reicht von April-August. Aus 4-7 Eiern schlüpfen nach 11-13 Tagen die Küken.

